

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор
ООО «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ»

Г.В. Локшин

«01» ноября 2022



ИНСТРУКЦИЯ № 004

по применению средства зоогигиенического инсектицидного
«**PROXIDER** Птичья радость»

Москва, 01.11.2022 г.

Инструкция по применению разработана ООО «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ», РФ, Московская обл., Наро-Фоминский район, рп. Селятино, ул. Профессиональная, д. 7, пом. 3.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство зоогигиеническое инсектицидное «**PROXIDER Птичья радость**» (далее – средство) предназначено для обработки перьевого покрова и мест содержания птицы от любых видов насекомых-эктопаразитов, (пухопероедов, чесоточных клещей, красных куриных клещей, блох, вшей и др.) обитающих в перьях, на теле птицы, в подстилке, в щелях помещения.

1.2. Средство представляет собой тонкодисперсный порошок белого цвета. Действующим веществом является минерал маршалит - диоксид кремния, подвергшийся высокотехнологичной обработке.

1.3. Средство воздействует на насекомое не химическим, а физическим способом: его частицы поглощают из насекомого-паразита влагу (гемолимфу). Данный принцип действия не позволяет насекомым выработать защиту (резистентность). Действие средства замедленное.

1.4. По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу средство относится к 4 классу малоопасных веществ по Классификации ГОСТ 12.1.007.76. ОБУВ (ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ) диоксида кремния аморфного в атмосферном воздухе городских и сельских поселений – 0,02 мг/м³.

1.5 Препарат является диэлектриком, не горюч.

1.6 Срок годности – неограничен при соблюдении правил хранения в невскрытой упаковке изготовителя.

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, НОРМЫ РАСХОДА

2.1. Перед применением средства **не забудьте** очистить место содержания птицы от имеющейся подстилки — это идеальное место для размножения паразитов.

2.2. В зависимости от численности и заселенности эктопаразитами, а также категории сложности объекта норма расхода средства составляет 5-10 г/м² обрабатываемой поверхности.

2.3. Для уничтожения насекомых-эктопаразитов встряхнуть флакон, отрезать носик колпачка для получения отверстия и легким нажатием на флакон распылить на птицу, уделив особое внимание области под крылом, спине и нижним конечностям. **НЕ СМЫВАТЬ!** Также распылите средство по стенам и полу помещения, где содержится птица, особенно важно обработать углы и щели (места гнездования насекомых), при необходимости внести в свежую подстилку. При больших объемах обработку можно провести с помощью специальной распыливающей аппаратуры (электрические или ручные дустеры). Для этого необходимое количество средства помещают в бак аппарата и с помощью распылительной трубки равномерно наносят средство на обрабатываемые поверхности.

Средство не действует на отложенные яйца насекомых, поэтому для полного уничтожения популяции эктопаразитов необходимо дождаться пока новое поколение появится на свет и на его покровы попадут частицы порошка. Следовательно, процедуру опудривания перьев птицы необходимо повторить через 7-10 дней в летний период, через 10-16 - в зимний.

2.4. В целях профилактики необходимо приготовить специальную смесь из мелкого сухого песка и средства в соотношении 1:1. Полученную смесь засыпать в плоские емкости и разместить в местах содержания птицы. Птицы сами будут садиться в такие ванны и активно стряхивать с себя вредителей. Располагают купальни в подветренных сухих, а межсезонье прогреваемых солнцем, местах.

2.5. Внесение подстилки в помещение (курытники, сараи, загоны, вольеры и т.п.) может осуществляться в присутствии птиц на сухие поверхности, в том числе солому

(опилки и т.п.) как на свежую, так и на использованную. Частота и дозировка зависит от плотности посадки птицы, её производственного назначения и массы (см. таблицу 1).

Таблица 1. Рекомендуемые нормы внесения подстилки в помещения для содержания домашней птицы при наличии выгульных площадок*

Порода и технологическая группа			Дозировка, г/м ²
Куры	Взрослые и молодняк старше 2 мес.	Яичные породы/кроссы	5-10
		Мясные (бройлеры)	5-10
	Цыплята		до 5
Перепела	Взрослые и молодняк старше 4 мес.		5-10
	Цыплята и молодняк до 4 мес.		до 5
Цесарки	Взрослые и молодняк старше 3 мес.		5-10
	Цыплята и молодняк до 3 мес.		до 5
Индейки	Взрослые и молодняк старше 4 мес.		7-15
	Индюшата и молодняк до 4 мес.		до 7

*Примечание. Нормы указаны для плотности посадки кур-несушек и цесарок не более 6 голов на 1 м² пола помещения, для бройлеров – 4 головы на 1 м², индюшек – 3 головы на м², перепелок 10 голов на 1 м². При большей плотности или при отсутствии достаточных выгульных площадок указанные максимальные дозировки могут быть увеличены.

Нельзя использовать одновременно с растворами и эмульсиями синтетических инсектоакарицидов. Подобное сочетание снижает эффективность последних.

Внесение подстилки возможно в присутствии животных, корма и поверх обычных подстилок.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 3.1. Применять строго по назначению.
- 3.2. При использовании средства избегать его вдыхания, попадания на кожу и в глаза.
- 3.3. Обработку проводят с использованием спецодежды (халат, костюм или комбинезон хлопчатобумажный, головной убор, перчатки резиновые), средств индивидуальной защиты органов дыхания (противопылевые маски или универсальные респираторы) и глаз (защитные очки).
- 3.4. Обработки проводить при закрытых форточках (окнах) в отсутствие людей.
- 3.5. После выполнения обработки руки помыть водой с мылом и обработать увлажняющим кремом.
- 3.6. При попадании средства на кожу – смыть большим количеством воды, вымыть руки с мылом и обработать увлажняющим кремом. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

- 4.1. Допускается к транспортированию любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
- 4.2. Средство хранят на закрытых площадках или в сухих складских помещениях в упаковке производителя. Требование к температуре и влажности не регламентируются при условии целостности упаковки.
- 4.3. Препарат оберегать от увлажнения и смачивания не дистиллированной водой.
- 4.4. Средство упаковывается в пластиковые флаконы по 130г, закупоренные пластиковыми крышками с носиком-распылителем или пластмассовые банки по 1000-5000 г., закупоренные пластиковыми крышками, в многослойные бумажные мешки,

полиэтиленовые мешки или мягкие контейнеры с полипропиленовым вкладышем (типа биг-бэг) вместимостью 5000-10000 г.

4.5. При транспортировании, хранении и утилизации не представляет опасности для окружающей среды. Использованные упаковки утилизировать как твердые бытовые отходы.